

SS 2014

# Zentralübung zur Vorlesung Diskrete Wahrscheinlichkeitstheorie

Dr. Werner Meixner

Fakultät für Informatik  
TU München

<http://www14.in.tum.de/lehre/2014SS/dwt/uebung/>

8. Mai 2014

## Übersicht:

1. Übungsbetrieb Fragen  
Zusatzaufgabe 1
2. Thema Verteilungen
3. Vorbereitung VA Blatt 4

# 1. Übungsbetrieb

Fragen?

# 1. Übungsbetrieb

Fragen?

## Neue Korrekturregeln und Zusatzaufgabe 1

Die erhaltenen Punkte bei 4 Aufgaben  $A_1, A_2, A_3$  bzw.  $A_4$  eines Übungsblattes seien bei vollständiger Korrektur  $a_1, a_2, a_3$  bzw.  $a_4$ . Die erhaltene Punktesumme ist dann  $a_1 + a_2 + a_3 + a_4$ .

Zur Reduzierung der Korrekturarbeit werden Laplace-zufällig 2 Aufgaben ausgewählt, diese beiden Aufgaben vollständig korrigiert und anschließend die Punktesumme  $P$  der beiden Aufgaben verdoppelt gutgeschrieben.

Berechnen Sie den Erwartungswert  $\mathbb{E}[P]$  der gutgeschriebenen Punktesumme!

Lösung

Es gilt  $\mathbb{E}[P] = a_1 + a_2 + a_3 + a_4$ .

## Neue Korrekturregeln und Zusatzaufgabe 1

Die erhaltenen Punkte bei 4 Aufgaben  $A_1, A_2, A_3$  bzw.  $A_4$  eines Übungsblattes seien bei vollständiger Korrektur  $a_1, a_2, a_3$  bzw.  $a_4$ . Die erhaltene Punktesumme ist dann  $a_1 + a_2 + a_3 + a_4$ .

Zur Reduzierung der Korrekturarbeit werden Laplace-zufällig 2 Aufgaben ausgewählt, diese beiden Aufgaben vollständig korrigiert und anschließend die Punktesumme  $P$  der beiden Aufgaben verdoppelt gutgeschrieben.

Berechnen Sie den Erwartungswert  $\mathbb{E}[P]$  der gutgeschriebenen Punktesumme!

Lösung

Es gilt  $\mathbb{E}[P] = a_1 + a_2 + a_3 + a_4$ .

## Neue Korrekturregeln und Zusatzaufgabe 1

Die erhaltenen Punkte bei 4 Aufgaben  $A_1, A_2, A_3$  bzw.  $A_4$  eines Übungsblattes seien bei vollständiger Korrektur  $a_1, a_2, a_3$  bzw.  $a_4$ . Die erhaltene Punktesumme ist dann  $a_1 + a_2 + a_3 + a_4$ .

Zur Reduzierung der Korrekturarbeit werden Laplace-zufällig 2 Aufgaben ausgewählt, diese beiden Aufgaben vollständig korrigiert und anschließend die Punktesumme  $P$  der beiden Aufgaben verdoppelt gutgeschrieben.

Berechnen Sie den Erwartungswert  $\mathbb{E}[P]$  der gutgeschriebenen Punktesumme!

### Lösung

Es gilt  $\mathbb{E}[P] = a_1 + a_2 + a_3 + a_4$ .

## 2. Thema: Verteilungen

Ziel: Den Zusammenhang unter gewissen Verteilungen herstellen.

2.1 Welche Verteilungen betrachten wir?



## 2. Thema: Verteilungen

**Ziel:** Den Zusammenhang unter gewissen Verteilungen herstellen.

2.1 Welche Verteilungen betrachten wir?

## 2. Thema: Verteilungen

**Ziel:** Den Zusammenhang unter gewissen Verteilungen herstellen.

### 2.1 Welche Verteilungen betrachten wir?

Diskrete Verteilungen, die eng mit Bernoulli-verteiltern Zufallsvariablen zusammenhängen:

- Binomialverteilung  $B(n, p)$
- Negativ-Binomialverteilung  $NB(r, p)$
- Geometrische Verteilung  $Ge(p)$
- Poissonverteilung  $Po(\lambda)$
- Hypergeometrische Verteilung  $Hyg(N, n, K)$

Dabei gilt für die Argumente der Dichtefunktionen entsprechend  $z \in \mathbb{N}$  bzw.  $z \in \mathbb{N}$  bzw.  $x \in \mathbb{N}_0$  bzw.  $x \in \mathbb{N}_0$ .

Für alle übrigen Argumente aus  $\mathbb{R}$  werden die Dichten gleich 0 gesetzt.

Diskrete Verteilungen, die eng mit Bernoulli-verteilten Zufallsvariablen zusammenhängen:

- Geometrische Verteilung  $\text{Geo}(p)$ :  $f_{Z_1}(z) = pq^{z-1}$ .

- Negativ-Binomial-Verteilung  $\text{NegativBin}(x, p)$ :

$$f_{Z_2}(z) = \binom{z-1}{x-1} p^x q^{z-x}$$

- Binomialverteilung  $\text{Bin}(z, p)$ :  $f_{X_1}(x) = \binom{z}{x} p^x q^{z-x}$ .

- Poisson-Verteilung  $\text{Po}(\lambda)$ :  $f_{X_2}(x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}$ .

Dabei gilt für die Argumente der Dichtefunktionen entsprechend  $z \in \mathbb{N}$  bzw.  $z \in \mathbb{N}$  bzw.  $x \in \mathbb{N}_0$  bzw.  $x \in \mathbb{N}_0$ .

Für alle übrigen Argumente aus  $\mathbb{R}$  werden die Dichten gleich 0 gesetzt.

Diskrete Verteilungen, die eng mit Bernoulli-verteilten Zufallsvariablen zusammenhängen:

- Geometrische Verteilung  $\text{Geo}(p)$ :  $f_{Z_1}(z) = pq^{z-1}$ .

- Negativ-Binomial-Verteilung  $\text{NegativBin}(x, p)$ :

$$f_{Z_2}(z) = \binom{z-1}{x-1} p^x q^{z-x}$$

- Binomialverteilung  $\text{Bin}(z, p)$ :  $f_{X_1}(x) = \binom{z}{x} p^x q^{z-x}$ .

- Poisson-Verteilung  $\text{Po}(\lambda)$ :  $f_{X_2}(x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}$ .

Dabei gilt für die Argumente der Dichtefunktionen entsprechend  $z \in \mathbb{N}$  bzw.  $z \in \mathbb{N}$  bzw.  $x \in \mathbb{N}_0$  bzw.  $x \in \mathbb{N}_0$ .

Für alle übrigen Argumente aus  $\mathbb{R}$  werden die Dichten gleich 0 gesetzt.

Diskrete Verteilungen, die eng mit Bernoulli-verteilten Zufallsvariablen zusammenhängen:

- Geometrische Verteilung  $\text{Geo}(p)$ :  $f_{Z_1}(z) = pq^{z-1}$ .

- Negativ-Binomial-Verteilung  $\text{NegativBin}(x, p)$ :

$$f_{Z_2}(z) = \binom{z-1}{x-1} p^x q^{z-x}$$

- Binomialverteilung  $\text{Bin}(z, p)$ :  $f_{X_1}(x) = \binom{z}{x} p^x q^{z-x}$ .

- Poisson-Verteilung  $\text{Po}(\lambda)$ :  $f_{X_2}(x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}$ .

Dabei gilt für die Argumente der Dichtefunktionen entsprechend  $z \in \mathbb{N}$  bzw.  $z \in \mathbb{N}$  bzw.  $x \in \mathbb{N}_0$  bzw.  $x \in \mathbb{N}_0$ .

Für alle übrigen Argumente aus  $\mathbb{R}$  werden die Dichten gleich 0 gesetzt.

Diskrete Verteilungen, die eng mit Bernoulli-verteilten Zufallsvariablen zusammenhängen:

- Geometrische Verteilung  $\text{Geo}(p)$ :  $f_{Z_1}(z) = pq^{z-1}$ .

- Negativ-Binomial-Verteilung  $\text{NegativBin}(x, p)$ :

$$f_{Z_2}(z) = \binom{z-1}{x-1} p^x q^{z-x}$$

- Binomialverteilung  $\text{Bin}(z, p)$ :  $f_{X_1}(x) = \binom{z}{x} p^x q^{z-x}$ .

- Poisson-Verteilung  $\text{Po}(\lambda)$ :  $f_{X_2}(x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}$ .

Dabei gilt für die Argumente der Dichtefunktionen entsprechend  $z \in \mathbb{N}$  bzw.  $z \in \mathbb{N}$  bzw.  $x \in \mathbb{N}_0$  bzw.  $x \in \mathbb{N}_0$ .

Für alle übrigen Argumente aus  $\mathbb{R}$  werden die Dichten gleich 0 gesetzt.

Diskrete Verteilungen, die eng mit Bernoulli-verteilten Zufallsvariablen zusammenhängen:

- Geometrische Verteilung  $\text{Geo}(p)$ :  $f_{Z_1}(z) = pq^{z-1}$ .

- Negativ-Binomial-Verteilung  $\text{NegativBin}(x, p)$ :

$$f_{Z_2}(z) = \binom{z-1}{x-1} p^x q^{z-x}$$

- Binomialverteilung  $\text{Bin}(z, p)$ :  $f_{X_1}(x) = \binom{z}{x} p^x q^{z-x}$ .

- Poisson-Verteilung  $\text{Po}(\lambda)$ :  $f_{X_2}(x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}$ .

Dabei gilt für die Argumente der Dichtefunktionen entsprechend  $z \in \mathbb{N}$  bzw.  $z \in \mathbb{N}$  bzw.  $x \in \mathbb{N}_0$  bzw.  $x \in \mathbb{N}_0$ .

Für alle übrigen Argumente aus  $\mathbb{R}$  werden die Dichten gleich 0 gesetzt.



Diskrete Verteilungen, die eng mit Bernoulli-verteilten Zufallsvariablen zusammenhängen:

- Geometrische Verteilung  $\text{Geo}(p)$ :  $f_{Z_1}(z) = pq^{z-1}$ .

- Negativ-Binomial-Verteilung  $\text{NegativBin}(x, p)$ :

$$f_{Z_2}(z) = \binom{z-1}{x-1} p^x q^{z-x}$$

- Binomialverteilung  $\text{Bin}(z, p)$ :  $f_{X_1}(x) = \binom{z}{x} p^x q^{z-x}$ .

- Poisson-Verteilung  $\text{Po}(\lambda)$ :  $f_{X_2}(x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}$ .

Dabei gilt für die Argumente der Dichtefunktionen entsprechend  $z \in \mathbb{N}$  bzw.  $z \in \mathbb{N}$  bzw.  $x \in \mathbb{N}_0$  bzw.  $x \in \mathbb{N}_0$ .

Für alle übrigen Argumente aus  $\mathbb{R}$  werden die Dichten gleich 0 gesetzt.

## 2.2 Beispiel einer negativen Binomialverteilung

### VA 4

Wir wählen nacheinander (gleichverteilt) zufällig und unabhängig Buchstaben aus der Multimenge der Buchstaben des Wortes CHOOSE aus.

Berechnen Sie Erwartungswert und Varianz der folgenden Zufallsvariablen  $Z$ :

$Z :=$  Anzahl der Züge (mit Zurücklegen)  
bis zum dritten Mal 0 gezogen wurde.

Vergleichen Sie VA 3 von Blatt 3!

## 2.2 Beispiel einer negativen Binomialverteilung

### VA 4

Wir wählen nacheinander (gleichverteilt) zufällig und unabhängig Buchstaben aus der Multimenge der Buchstaben des Wortes CHOOSE aus.

Berechnen Sie Erwartungswert und Varianz der folgenden Zufallsvariablen  $Z$ :

$Z :=$  Anzahl der Züge (mit Zurücklegen)  
bis zum dritten Mal 0 gezogen wurde.

Vergleichen Sie VA 3 von Blatt 3!

## Bestimmung der Verteilung für $Z$

Die Aufgabe ist ein Spezialfall der Bestimmung der Wahrscheinlichkeit, dass bei der Wiederholung  $z$  der Auswertung einer Bernoulli mit Erfolgswahrscheinlichkeit  $p$  verteilten Zufallsvariablen  $I$  zum  $x$ -ten Mal das Ereignis  $I = 1$  eintritt.

Die Wahrscheinlichkeitsdichte von  $Z$  ist

$$f_Z(z) = \binom{z-1}{x-1} p^x q^{z-x}.$$

Für  $p = \frac{1}{3}$  und  $k = 3$  folgt also

$$f_Z(z) = \binom{z-1}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^3 \left(\frac{2}{3}\right)^{z-3}.$$

## Bestimmung der Verteilung für $Z$

Die Aufgabe ist ein Spezialfall der Bestimmung der Wahrscheinlichkeit, dass bei der Wiederholung  $z$  der Auswertung einer Bernoulli mit Erfolgswahrscheinlichkeit  $p$  verteilten Zufallsvariablen  $I$  zum  $x$ -ten Mal das Ereignis  $I = 1$  eintritt.

Die Wahrscheinlichkeitsdichte von  $Z$  ist

$$f_Z(z) = \binom{z-1}{x-1} p^x q^{z-x}.$$

Für  $p = \frac{1}{3}$  und  $k = 3$  folgt also

$$f_Z(z) = \binom{z-1}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^3 \left(\frac{2}{3}\right)^{z-3}.$$

## Bestimmung der Verteilung für $Z$

Die Aufgabe ist ein Spezialfall der Bestimmung der Wahrscheinlichkeit, dass bei der Wiederholung  $z$  der Auswertung einer Bernoulli mit Erfolgswahrscheinlichkeit  $p$  verteilten Zufallsvariablen  $I$  zum  $x$ -ten Mal das Ereignis  $I = 1$  eintritt.

Die Wahrscheinlichkeitsdichte von  $Z$  ist

$$f_Z(z) = \binom{z-1}{x-1} p^x q^{z-x}.$$

Für  $p = \frac{1}{3}$  und  $k = 3$  folgt also

$$f_Z(z) = \binom{z-1}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^3 \left(\frac{2}{3}\right)^{z-3}.$$

## Berechnung $\mathbb{E}[Z]$ und $\text{Var}[Z]$

Wir berechnen nicht direkt, sondern nutzen die folgende Darstellung:

Es gilt

$$Z = Z_1 + Z_2 + Z_2,$$

wobei  $Z_1, Z_2, Z_3$  unabhängige und geometrisch verteilte Zufallsvariable sind mit  $p = \frac{1}{3}$ .

Dann gilt  $\mathbb{E}[Z_i] = 3$  und  $\text{Var}[Z_i] = \frac{q}{p^2} = \frac{2}{3} \cdot 9 = 6$ .

Ergebnis:

$$\mathbb{E}[Z] = 3 \cdot 3 = 9 \quad \text{und} \quad \text{Var}[Z] = 3 \cdot 9 = 27.$$

## Berechnung $\mathbb{E}[Z]$ und $\text{Var}[Z]$

Wir berechnen nicht direkt, sondern nutzen die folgende Darstellung:

Es gilt

$$Z = Z_1 + Z_2 + Z_3,$$

wobei  $Z_1, Z_2, Z_3$  unabhängige und geometrisch verteilte Zufallsvariable sind mit  $p = \frac{1}{3}$ .

Dann gilt  $\mathbb{E}[Z_i] = 3$  und  $\text{Var}[Z_i] = \frac{q}{p^2} = \frac{2}{3} \cdot 9 = 6$ .

Ergebnis:

$$\mathbb{E}[Z] = 3 \cdot 3 = 9 \quad \text{und} \quad \text{Var}[Z] = 3 \cdot 6 = 18.$$



## Berechnung $\mathbb{E}[Z]$ und $\text{Var}[Z]$

Wir berechnen nicht direkt, sondern nutzen die folgende Darstellung:

Es gilt

$$Z = Z_1 + Z_2 + Z_2,$$

wobei  $Z_1, Z_2, Z_3$  unabhängige und geometrisch verteilte Zufallsvariable sind mit  $p = \frac{1}{3}$ .

Dann gilt  $\mathbb{E}[Z_i] = 3$  und  $\text{Var}[Z_i] = \frac{q}{p^2} = \frac{2}{3} \cdot 9 = 6$ .

Ergebnis:

$$\mathbb{E}[Z] = 3 \cdot 3 = 9 \quad \text{und} \quad \text{Var}[Z] = 3 \cdot 6 = 18.$$

## Berechnung $\mathbb{E}[Z]$ und $\text{Var}[Z]$

Wir berechnen nicht direkt, sondern nutzen die folgende Darstellung:

Es gilt

$$Z = Z_1 + Z_2 + Z_2,$$

wobei  $Z_1, Z_2, Z_3$  unabhängige und geometrisch verteilte Zufallsvariable sind mit  $p = \frac{1}{3}$ .

Dann gilt  $\mathbb{E}[Z_i] = 3$  und  $\text{Var}[Z_i] = \frac{q}{p^2} = \frac{2}{3} \cdot 9 = 6$ .

Ergebnis:

$$\mathbb{E}[Z] = 3 \cdot 3 = 9 \quad \text{und} \quad \text{Var}[Z] = 3 \cdot 6 = 18.$$

## Berechnung $\mathbb{E}[Z]$ und $\text{Var}[Z]$

Wir berechnen nicht direkt, sondern nutzen die folgende Darstellung:

Es gilt

$$Z = Z_1 + Z_2 + Z_2,$$

wobei  $Z_1, Z_2, Z_3$  unabhängige und geometrisch verteilte Zufallsvariable sind mit  $p = \frac{1}{3}$ .

Dann gilt  $\mathbb{E}[Z_i] = 3$  und  $\text{Var}[Z_i] = \frac{q}{p^2} = \frac{2}{3} \cdot 9 = 6$ .

Ergebnis:

$$\mathbb{E}[Z] = 3 \cdot 3 = 9 \quad \text{und} \quad \text{Var}[Z] = 3 \cdot 6 = 18.$$

## 2.3 Beispiel einer geometrischen Verteilung

TA 4 von Blatt 3

## 2.4 Das Konzept der Wiederholung bei Zufallsvariablen

Viele wahrscheinlichkeitstheoretische Experimente werden durch unabhängige **Wiederholung** eines bestimmten Experiments definiert.

Dem entspricht die Betrachtung einer (unendlichen) Folge von unabhängigen Zufallsvariablen

$I_{p,1}, I_{p,2}, \dots, I_{p,n}, \dots$ , die wie folgt definiert werden:

## 2.4 Das Konzept der Wiederholung bei Zufallsvariablen

Viele wahrscheinlichkeitstheoretische Experimente werden durch unabhängige **Wiederholung** eines bestimmten Experiments definiert.

Dem entspricht die Betrachtung einer (unendlichen) Folge von unabhängigen Zufallsvariablen

$I_{p,1}, I_{p,2}, \dots, I_{p,n}, \dots$ , die wie folgt definiert werden:

## 2.4 Das Konzept der Wiederholung bei Zufallsvariablen

Viele wahrscheinlichkeitstheoretische Experimente werden durch unabhängige **Wiederholung** eines bestimmten Experiments definiert.

Dem entspricht die Betrachtung einer (unendlichen) Folge von unabhängigen Zufallsvariablen

$I_{p,1}, I_{p,2}, \dots, I_{p,n}, \dots$ , die wie folgt definiert werden:

## Definition:

Sei  $I_p$  eine Bernoulli-verteilte Zufallsvariable über einem Wahrscheinlichkeitsraum  $(\Omega, \text{Pr})$  mit Erfolgswahrscheinlichkeit  $p$ .

Für alle  $n \in \mathbb{N}$  wird durch die unabhängige  $n$ -te Wiederholung der Auswertung von  $I_p$  eine Zufallsvariable  $I_{p,n}$  definiert.

„Aussage“:

Insgesamt erhält man ein unabhängiges System von unendlich vielen Zufallsvariablen mit gleicher Verteilung wie  $I_p$

$$I_{p,1}, I_{p,2}, \dots, I_{p,n}, \dots$$



## Definition:

Sei  $I_p$  eine Bernoulli-verteilte Zufallsvariable über einem Wahrscheinlichkeitsraum  $(\Omega, \text{Pr})$  mit Erfolgswahrscheinlichkeit  $p$ .

Für alle  $n \in \mathbb{N}$  wird durch die unabhängige  $n$ -te Wiederholung der Auswertung von  $I_p$  eine Zufallsvariable  $I_{p,n}$  definiert.

„Aussage“:

Insgesamt erhält man ein unabhängiges System von unendlich vielen Zufallsvariablen mit gleicher Verteilung wie  $I_p$

$$I_{p,1}, I_{p,2}, \dots, I_{p,n}, \dots$$

## Definition:

Sei  $I_p$  eine Bernoulli-verteilte Zufallsvariable über einem Wahrscheinlichkeitsraum  $(\Omega, \text{Pr})$  mit Erfolgswahrscheinlichkeit  $p$ .

Für alle  $n \in \mathbb{N}$  wird durch die unabhängige  $n$ -te Wiederholung der Auswertung von  $I_p$  eine Zufallsvariable  $I_{p,n}$  definiert.

## „Aussage“:

Insgesamt erhält man ein unabhängiges System von unendlich vielen Zufallsvariablen mit gleicher Verteilung wie  $I_p$

$$I_{p,1}, I_{p,2}, \dots, I_{p,n}, \dots$$

## Definition:

Sei  $I_p$  eine Bernoulli-verteilte Zufallsvariable über einem Wahrscheinlichkeitsraum  $(\Omega, \text{Pr})$  mit Erfolgswahrscheinlichkeit  $p$ .

Für alle  $n \in \mathbb{N}$  wird durch die unabhängige  $n$ -te Wiederholung der Auswertung von  $I_p$  eine Zufallsvariable  $I_{p,n}$  definiert.

## „Aussage“:

Insgesamt erhält man ein unabhängiges System von unendlich vielen Zufallsvariablen mit gleicher Verteilung wie  $I_p$

$$I_{p,1}, I_{p,2}, \dots, I_{p,n}, \dots$$

## Kritik der Definition bzw. „Aussage“ zur Unabhängigkeit:

Die Unabhängigkeit von  $v_1, \dots, v_n$  ist äquivalent zu

der Existenz von  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  mit  $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = 0$

und  $\alpha_1^2 + \dots + \alpha_n^2 > 0$ .

Die Nullvektoren  $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$  sind

immer eine Lösung für  $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = 0$ .

Die Nullvektoren  $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$  sind

immer eine Lösung für  $\alpha_1^2 + \dots + \alpha_n^2 > 0$ .

Die Nullvektoren  $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$  sind

immer eine Lösung für  $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = 0$ .

Die Nullvektoren  $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$  sind

immer eine Lösung für  $\alpha_1^2 + \dots + \alpha_n^2 > 0$ .

## Kritik der Definition bzw. „Aussage“ zur Unabhängigkeit:

- 1 Systeme von „unabhängigen“ Zufallsvariablen setzen einen gemeinsamen Wahrscheinlichkeitsraum voraus.

Aber!

Auf  $(\Omega, \Pr)$  sind alle  $I_{p,i}$  identisch und insbesondere abhängig.

Dies kann also **nicht!** der geforderte gemeinsame Wahrscheinlichkeitsraum sein.

- 2 Man kann zeigen nachprüfen, dass die Unabhängigkeit der  $I_{p,i}$  nicht aus der Unabhängigkeit der  $I_{p,i}$  folgt. Die Unabhängigkeit der  $I_{p,i}$  ist ein notwendiges, aber kein hinreichendes Kriterium für die Unabhängigkeit der  $I_{p,i}$ .

## Kritik der Definition bzw. „Aussage“ zur Unabhängigkeit:

- 1 Systeme von „unabhängigen“ Zufallsvariablen setzen einen gemeinsamen Wahrscheinlichkeitsraum voraus.

Aber!

Auf  $(\Omega, \Pr)$  sind alle  $I_{p,i}$  identisch und insbesondere abhängig.

Dies kann also **nicht!** der geforderte gemeinsame Wahrscheinlichkeitsraum sein.

- 2 Man kann zeigen nachprüfen, dass die Definition der Unabhängigkeit für Zufallsvariablen  $X_1, \dots, X_n$  auf einem Wahrscheinlichkeitsraum  $(\Omega, \mathcal{F}, \Pr)$  nicht äquivalent zu den üblichen Forderungen an die Unabhängigkeit ist.

## Kritik der Definition bzw. „Aussage“ zur Unabhängigkeit:

- 1 Systeme von „unabhängigen“ Zufallsvariablen setzen einen gemeinsamen Wahrscheinlichkeitsraum voraus.

Aber!

Auf  $(\Omega, \Pr)$  sind alle  $I_{p,i}$  identisch und insbesondere abhängig.

Dies kann also **nicht!** der geforderte gemeinsame Wahrscheinlichkeitsraum sein.

- 2 Man kann zeigen nachprüfen, dass die Unabhängigkeit der  $I_{p,i}$  nicht ausreicht, um die Unabhängigkeit der  $I_{p,i}$  zu garantieren. Dies ist ein notwendiges, aber nicht hinreichendes Kriterium für die Unabhängigkeit der  $I_{p,i}$ .

## Kritik der Definition bzw. „Aussage“ zur Unabhängigkeit:

- ① Systeme von „unabhängigen“ Zufallsvariablen setzen einen gemeinsamen Wahrscheinlichkeitsraum voraus.

Aber!

Auf  $(\Omega, \Pr)$  sind alle  $I_{p,i}$  identisch und insbesondere abhängig.

Dies kann also nicht! der geforderte gemeinsame Wahrscheinlichkeitsraum sein.



## Kritik der Definition bzw. „Aussage“ zur Unabhängigkeit:

- 1 Systeme von „unabhängigen“ Zufallsvariablen setzen einen gemeinsamen Wahrscheinlichkeitsraum voraus.

Aber!

Auf  $(\Omega, \Pr)$  sind alle  $I_{p,i}$  identisch und insbesondere abhängig.

Dies kann also nicht! der geforderte gemeinsame Wahrscheinlichkeitsraum sein.

- 2 Man kann sogar nachweisen, dass kein! diskreter gemeinsamer Wahrscheinlichkeitsraum existiert, der in sinnvoller Weise alle notwendigen Forderungen erfüllt!

# Was ist zu tun?

## 1. Lösungsmöglichkeit:

Man betrachtet stets nur **endliche Abschnitte** der Folge und kann dann für diese Folge den **W'keitsraum** als endliches Produkt der Räume für die beteiligten Bernoulli-verteilten Variablen. In diesem Fall kommt man mit der bisherigen Definition der **W'keitsräume** aus.

## 2. Lösungsmöglichkeit:

Wir definieren ein neues Konzept für **Wahrscheinlichkeitsräume** nach **Kolmogorov**, in dem es keine atomaren Ereignisse gibt.

## Was ist zu tun?

### 1. Lösungsmöglichkeit:

Man betrachtet stets nur **endliche Abschnitte** der Folge und kann dann für diese Folge den  $W$ 'keitsraum als endliches Produkt der Räume für die beteiligten Bernoulli-verteilten Variablen. In diesem Fall kommt man mit der bisherigen Definition der  $W$ 'keitsräume aus.

### 2. Lösungsmöglichkeit:

Wir definieren ein neues Konzept für Wahrscheinlichkeitsräume nach **Kolmogorov**, in dem es keine atomaren Ereignisse gibt.

## Was ist zu tun?

### 1. Lösungsmöglichkeit:

Man betrachtet stets nur **endliche Abschnitte** der Folge und kann dann für diese Folge den  $W'$ keitsraum als endliches Produkt der Räume für die beteiligten Bernoulli-verteilten Variablen. In diesem Fall kommt man mit der bisherigen Definition der  $W'$ keitsräume aus.

### 2. Lösungsmöglichkeit:

Wir definieren ein neues Konzept für Wahrscheinlichkeitsräume nach **Kolmogorov**, in dem es keine atomaren Ereignisse gibt.

## Pragmatisches Vorgehen:

Wir können die Frage nach einem gemeinsamen Definitionsbereich der Variablen einer unendlichen Folge zurückstellen.

Wir behandeln die zweite Lösungsmöglichkeit in nachfolgenden Blättern.

## Pragmatisches Vorgehen:

Wir können die Frage nach einem gemeinsamen Definitionsbereich der Variablen einer unendlichen Folge zurückstellen.

Wir behandeln die zweite Lösungsmöglichkeit in nachfolgenden Blättern.

## Pragmatisches Vorgehen:

Wir können die Frage nach einem gemeinsamen Definitionsbereich der Variablen einer unendlichen Folge zurückstellen.

Wir behandeln die zweite Lösungsmöglichkeit in nachfolgenden Blättern.

## 2.5 Gemeinsame Herleitung der Verteilungen

Wir betrachten die unbegrenzte ( $\infty$ -fache) **Wiederholung** eines Experiments mit den Ereignissen eines Wahrscheinlichkeitsraumes  $(\Omega, \text{Pr})$  und der Bewertung der Ereignisse durch  $I_p$

wie folgt:

Bei unbegrenzter Wiederholung des Experiments erhalten wir eine Folge von Ergebnissen  $\omega_1, \omega_2, \dots$  mit Bewertungen  $I_p(\omega_1), I_p(\omega_2), \dots$ .

Dann können wir eine unendliche Folge von Zufallsvariablen  $I_{p,1}, I_{p,2}, \dots$  definieren durch Abbildungen  $I_{p,i} : \Omega^{\mathbb{N}} \rightarrow \{0, 1\}$  mit

$$I_{p,i}((\omega_1, \omega_2, \dots)) = I_p(\omega_i).$$



## 2.5 Gemeinsame Herleitung der Verteilungen

Wir betrachten die unbegrenzte ( $\infty$ -fache) **Wiederholung** eines Experiments mit den Ereignissen eines Wahrscheinlichkeitsraumes  $(\Omega, \text{Pr})$  und der Bewertung der Ereignisse durch  $I_p$

wie folgt:

Bei unbegrenzter Wiederholung des Experiments erhalten wir eine Folge von Ergebnissen  $\omega_1, \omega_2, \dots$  mit Bewertungen  $I_p(\omega_1), I_p(\omega_2), \dots$ .

Dann können wir eine unendliche Folge von Zufallsvariablen  $I_{p,1}, I_{p,2}, \dots$  definieren durch Abbildungen  $I_{p,i} : \Omega^{\mathbb{N}} \rightarrow \{0, 1\}$  mit

$$I_{p,i}((\omega_1, \omega_2, \dots)) = I_p(\omega_i).$$

## 2.5 Gemeinsame Herleitung der Verteilungen

Wir betrachten die unbegrenzte ( $\infty$ -fache) **Wiederholung** eines Experiments mit den Ereignissen eines Wahrscheinlichkeitsraumes  $(\Omega, \text{Pr})$  und der Bewertung der Ereignisse durch  $I_p$

wie folgt:

Bei unbegrenzter Wiederholung des Experiments erhalten wir eine Folge von Ergebnissen  $\omega_1, \omega_2, \dots$  mit Bewertungen  $I_p(\omega_1), I_p(\omega_2), \dots$ .

Dann können wir eine unendliche Folge von Zufallsvariablen  $I_{p,1}, I_{p,2}, \dots$  definieren durch Abbildungen  $I_{p,i} : \Omega^{\mathbb{N}} \rightarrow \{0, 1\}$  mit

$$I_{p,i}((\omega_1, \omega_2, \dots)) = I_p(\omega_i).$$

## 2.5 Gemeinsame Herleitung der Verteilungen

Wir betrachten die unbegrenzte ( $\infty$ -fache) **Wiederholung** eines Experiments mit den Ereignissen eines Wahrscheinlichkeitsraumes  $(\Omega, \text{Pr})$  und der Bewertung der Ereignisse durch  $I_p$

wie folgt:

Bei unbegrenzter Wiederholung des Experiments erhalten wir eine Folge von Ergebnissen  $\omega_1, \omega_2, \dots$  mit Bewertungen  $I_p(\omega_1), I_p(\omega_2), \dots$ .

Dann können wir eine unendliche Folge von Zufallsvariablen  $I_{p,1}, I_{p,2}, \dots$  definieren durch Abbildungen  $I_{p,i} : \Omega^{\mathbb{N}} \rightarrow \{0, 1\}$  mit

$$I_{p,i}((\omega_1, \omega_2, \dots)) = I_p(\omega_i).$$

Sei  $Y = I_{p,1}, I_{p,2}, \dots, I_{p,z}, \dots$ .

Sei  $A_{x,z}$  die Menge aller Folgen  $Y$  aus  $\Omega^{\mathbb{N}}$  mit der Eigenschaft, dass in der Folge  $Y$  an  $z$ -ter Stelle das  $x$ -te Mal eine 1 aufgetreten ist.

In der Sprache von Wahrscheinlichkeitsräumen würden wir sagen:  $A_{x,z}$  ist das Ereignis über  $\Omega^{\mathbb{N}}$ , dass in der Folge  $Y$  an  $z$ -ter Stelle das  $x$ -te Mal eine 1 aufgetreten ist.

In jedem sinnvoll zu Grunde gelegten W'keitsraum über endlichen Abschnitten der Folgen (sowie auch in später eingeführten W'keitsräumen nach Kolmogorov) gilt dann

$$P_r[A_{x,z}] = \binom{z-1}{x-1} p^x q^{z-x}.$$

Bemerkung: Die Mengen (Ereignisse)  $A_{x,z}$  sind disjunkt.

Sei  $Y = I_{p,1}, I_{p,2}, \dots, I_{p,z}, \dots$ .

Sei  $A_{x,z}$  die Menge aller Folgen  $Y$  aus  $\Omega^{\mathbb{N}}$  mit der Eigenschaft, dass in der Folge  $Y$  an  $z$ -ter Stelle das  $x$ -te Mal eine 1 aufgetreten ist.

In der Sprache von Wahrscheinlichkeitsräumen würden wir sagen:  $A_{x,z}$  ist das Ereignis über  $\Omega^{\mathbb{N}}$ , dass in der Folge  $Y$  an  $z$ -ter Stelle das  $x$ -te Mal eine 1 aufgetreten ist.

In jedem sinnvoll zu Grunde gelegten W'keitsraum über endlichen Abschnitten der Folgen (sowie auch in später eingeführten W'keitsräumen nach Kolmogorov) gilt dann

$$Pr[A_{x,z}] = \binom{z-1}{x-1} p^x q^{z-x}.$$

Bemerkung: Die Mengen (Ereignisse)  $A_{x,z}$  sind disjunkt.

Sei  $Y = I_{p,1}, I_{p,2}, \dots, I_{p,z}, \dots$ .

Sei  $A_{x,z}$  die Menge aller Folgen  $Y$  aus  $\Omega^{\mathbb{N}}$  mit der Eigenschaft, dass in der Folge  $Y$  an  $z$ -ter Stelle das  $x$ -te Mal eine 1 aufgetreten ist.

In der Sprache von Wahrscheinlichkeitsräumen würden wir sagen:  $A_{x,z}$  ist das Ereignis über  $\Omega^{\mathbb{N}}$ , dass in der Folge  $Y$  an  $z$ -ter Stelle das  $x$ -te Mal eine 1 aufgetreten ist.

In jedem sinnvoll zu Grunde gelegten W'keitsraum über endlichen Abschnitten der Folgen (sowie auch in später eingeführten W'keitsräumen nach Kolmogorov) gilt dann

$$Pr[A_{x,z}] = \binom{z-1}{x-1} p^x q^{z-x}.$$

Bemerkung: Die Mengen (Ereignisse)  $A_{x,z}$  sind disjunkt.

Sei  $Y = I_{p,1}, I_{p,2}, \dots, I_{p,z}, \dots$ .

Sei  $A_{x,z}$  die Menge aller Folgen  $Y$  aus  $\Omega^{\mathbb{N}}$  mit der Eigenschaft, dass in der Folge  $Y$  an  $z$ -ter Stelle das  $x$ -te Mal eine 1 aufgetreten ist.

In der Sprache von Wahrscheinlichkeitsräumen würden wir sagen:  $A_{x,z}$  ist das Ereignis über  $\Omega^{\mathbb{N}}$ , dass in der Folge  $Y$  an  $z$ -ter Stelle das  $x$ -te Mal eine 1 aufgetreten ist.

In jedem sinnvoll zu Grunde gelegten W'keitsraum über endlichen Abschnitten der Folgen (sowie auch in später eingeführten W'keitsräumen nach Kolmogorov) gilt dann

$$Pr[A_{x,z}] = \binom{z-1}{x-1} p^x q^{z-x}.$$

Bemerkung: Die Mengen (Ereignisse)  $A_{x,z}$  sind disjunkt.

Sei  $Y = I_{p,1}, I_{p,2}, \dots, I_{p,z}, \dots$ .

Sei  $A_{x,z}$  die Menge aller Folgen  $Y$  aus  $\Omega^{\mathbb{N}}$  mit der Eigenschaft, dass in der Folge  $Y$  an  $z$ -ter Stelle das  $x$ -te Mal eine 1 aufgetreten ist.

In der Sprache von Wahrscheinlichkeitsräumen würden wir sagen:  $A_{x,z}$  ist das Ereignis über  $\Omega^{\mathbb{N}}$ , dass in der Folge  $Y$  an  $z$ -ter Stelle das  $x$ -te Mal eine 1 aufgetreten ist.

In jedem sinnvoll zu Grunde gelegten W'keitsraum über endlichen Abschnitten der Folgen (sowie auch in später eingeführten W'keitsräumen nach Kolmogorov) gilt dann

$$Pr[A_{x,z}] = \binom{z-1}{x-1} p^x q^{z-x}.$$

**Bemerkung:** Die Mengen (Ereignisse)  $A_{x,z}$  sind disjunkt.



## Matrix der negativ binomialverteilten Wahrscheinlichkeiten

$Pr[A_{x,z}]$ :

$x =$	$z =$	1	2	3	4	...	$k$
1		$p$	$\binom{1}{0}pq$	$\binom{2}{0}pq^2$	$\binom{3}{0}pq^3$	...	
2		0	$p^2$	$\binom{2}{1}p^2q$	$\binom{3}{1}p^2q^2$	...	
3		0	0	$p^3$	$\binom{3}{2}p^3q$	...	
4		0	0	0	$p^4$	...	
$\vdots$						$\vdots$	
$i$						...	$\binom{k-1}{i-1}p^i q^{k-i}$

## Spaltensumme:

Für alle  $k \geq 1$  gilt

$$\sum_{i=1}^{\infty} \binom{k-1}{i-1} p^i q^{k-i} = p.$$

Wenn wir  $X_k$  definieren als Anzahl der Einsen im Vektor  $(I_{p,1}, I_{p,2}, \dots, I_{p,k-1})$  unter der Bedingung, dass  $I_{p,k} = 1$  gilt, dann ist  $X_k - 1$  binomialverteilt.

Spaltensumme:

Für alle  $k \geq 1$  gilt

$$\sum_{i=1}^{\infty} \binom{k-1}{i-1} p^i q^{k-i} = p.$$

Wenn wir  $X_k$  definieren als Anzahl der Einsen im Vektor  $(I_{p,1}, I_{p,2}, \dots, I_{p,k-1})$  unter der Bedingung, dass  $I_{p,k} = 1$  gilt, dann ist  $X_k - 1$  binomialverteilt.

## Spaltensumme:

Für alle  $k \geq 1$  gilt

$$\sum_{i=1}^{\infty} \binom{k-1}{i-1} p^i q^{k-i} = p.$$

Wenn wir  $X_k$  definieren als Anzahl der Einsen im Vektor  $(I_{p,1}, I_{p,2}, \dots, I_{p,k-1})$  unter der Bedingung, dass  $I_{p,k} = 1$  gilt, dann ist  $X_k - 1$  **binomialverteilt**.

## Zeilensumme:

Für alle  $i \geq 1$  gilt

$$\sum_{k=1}^{\infty} \binom{k-1}{i-1} p^i q^{k-i} = 1.$$

Wenn wir  $Z_i$  definieren als das minimale  $k$ , so dass der Vektor  $(I_{p,1}, I_{p,2}, \dots, I_{p,k})$  genau  $i$  Einsen enthält, dann ist  $Z_i$  negativ binomialverteilt.

Für  $i = 1$  ergibt sich die geometrische Verteilung und

$$\sum_{k=1}^{\infty} pq^{k-1} = 1.$$

## Zeilensumme:

Für alle  $i \geq 1$  gilt

$$\sum_{k=1}^{\infty} \binom{k-1}{i-1} p^i q^{k-i} = 1.$$

Wenn wir  $Z_i$  definieren als das minimale  $k$ , so dass der Vektor  $(I_{p,1}, I_{p,2}, \dots, I_{p,k})$  genau  $i$  Einsen enthält, dann ist  $Z_i$  negativ binomialverteilt.

Für  $i = 1$  ergibt sich die geometrische Verteilung und

$$\sum_{k=1}^{\infty} pq^{k-1} = 1.$$

## Zeilensumme:

Für alle  $i \geq 1$  gilt

$$\sum_{k=1}^{\infty} \binom{k-1}{i-1} p^i q^{k-i} = 1.$$

Wenn wir  $Z_i$  definieren als das minimale  $k$ , so dass der Vektor  $(I_{p,1}, I_{p,2}, \dots, I_{p,k})$  genau  $i$  Einsen enthält, dann ist  $Z_i$  **negativ binomialverteilt**.

Für  $i = 1$  ergibt sich die **geometrische Verteilung** und

$$\sum_{k=1}^{\infty} p q^{k-1} = 1.$$

## Zeilensumme:

Für alle  $i \geq 1$  gilt

$$\sum_{k=1}^{\infty} \binom{k-1}{i-1} p^i q^{k-i} = 1.$$

Wenn wir  $Z_i$  definieren als das minimale  $k$ , so dass der Vektor  $(I_{p,1}, I_{p,2}, \dots, I_{p,k})$  genau  $i$  Einsen enthält, dann ist  $Z_i$  **negativ binomialverteilt**.

Für  $i = 1$  ergibt sich die **geometrische Verteilung** und

$$\sum_{k=1}^{\infty} pq^{k-1} = 1.$$



Aus der Folge  $Y = I_{p,1}, I_{p,2}, \dots, I_{p,z}, \dots$  kann man bei festgehaltener Zeile  $i$  auch  $i$  geometrisch verteilte Zufallsvariable  $X_j$  definieren. Dabei sei  $X_j$  die Anzahl der Schritte ausgehend von der  $(j - 1)$ ten Eins bis zum Auftreten der  $j$ ten Eins in der Folge  $Y$ .

Dann gilt  $Z_i = \sum_{j=1}^i X_j$ .

Beachte:  $Z_i$  ist also eine Summe von geometrisch verteilten Zufallsvariablen  $X_j$ , mit der Konsequenz, dass man den Erwartungswert von  $Z_i$  als Summe von Erwartungswerten der geometrisch verteilten Zufallsvariablen  $X_j$  berechnen kann.

Aus der Folge  $Y = I_{p,1}, I_{p,2}, \dots, I_{p,z}, \dots$  kann man bei festgehaltener Zeile  $i$  auch  $i$  geometrisch verteilte Zufallsvariable  $X_j$  definieren. Dabei sei  $X_j$  die Anzahl der Schritte ausgehend von der  $(j - 1)$ ten Eins bis zum Auftreten der  $j$ ten Eins in der Folge  $Y$ . Dann gilt  $Z_i = \sum_{j=1}^i X_j$ .

Beachte:  $Z_i$  ist also eine Summe von geometrisch verteilten Zufallsvariablen  $X_j$ , mit der Konsequenz, dass man den Erwartungswert von  $Z_i$  als Summe von Erwartungswerten der geometrisch verteilten Zufallsvariablen  $X_j$  berechnen kann.

Aus der Folge  $Y = I_{p,1}, I_{p,2}, \dots, I_{p,z}, \dots$  kann man bei festgehaltener Zeile  $i$  auch  $i$  geometrisch verteilte Zufallsvariable  $X_j$  definieren. Dabei sei  $X_j$  die Anzahl der Schritte ausgehend von der  $(j - 1)$ ten Eins bis zum Auftreten der  $j$ ten Eins in der Folge  $Y$ . Dann gilt  $Z_i = \sum_{j=1}^i X_j$ .

**Beachte:**  $Z_i$  ist also eine Summe von geometrisch verteilten Zufallsvariablen  $X_j$ , mit der Konsequenz, dass man den Erwartungswert von  $Z_i$  als **Summe von Erwartungswerten** der geometrisch verteilten Zufallsvariablen  $X_j$  berechnen kann.

## 3. Vorbereitung VA Blatt 4

### 3.1 VA 1

In der statistischen Physik pflegt man die Verteilung gewisser Teilchen (Moleküle, Photonen, Elektronen, usw.) zu betrachten. Man nimmt an, dass sich jedes Teilchen durch einen Vektor von Kenngrößen charakterisieren läßt, der der Zuordnung des Teilchens in eine von  $N$  „Zellen“ eines „Phasenraumes“ entspricht. Der Zustand eines physikalischen Systems wird dann dadurch beschrieben, dass man angibt, wie viele Teilchen sich jeweils in einer Zelle befinden.

Die Annahme, dass jede Lage eines  $n$  Gasmoleküls in  $N$  Zellen gleichwahrscheinlich ist, ist Basis der *Maxwell-Boltzmannsche Statistik*. Dabei wird die Unterscheidbarkeit der Gasmoleküle vorausgesetzt.

## 3. Vorbereitung VA Blatt 4

### 3.1 VA 1

In der statistischen Physik pflegt man die Verteilung gewisser Teilchen (Moleküle, Photonen, Elektronen, usw.) zu betrachten. Man nimmt an, dass sich jedes Teilchen durch einen Vektor von Kenngrößen charakterisieren läßt, der der Zuordnung des Teilchens in eine von  $N$  „Zellen“ eines „Phasenraumes“ entspricht. Der Zustand eines physikalischen Systems wird dann dadurch beschrieben, dass man angibt, wie viele Teilchen sich jeweils in einer Zelle befinden.

Die Annahme, dass jede Lage eines  $n$  Gasmoleküls in  $N$  Zellen gleichwahrscheinlich ist, ist Basis der *Maxwell-Boltzmannsche Statistik*. Dabei wird die Unterscheidbarkeit der Gasmoleküle vorausgesetzt.

## 3. Vorbereitung VA Blatt 4

### 3.1 VA 1

In der statistischen Physik pflegt man die Verteilung gewisser Teilchen (Moleküle, Photonen, Elektronen, usw.) zu betrachten. Man nimmt an, dass sich jedes Teilchen durch einen Vektor von Kenngrößen charakterisieren läßt, der der Zuordnung des Teilchens in eine von  $N$  „Zellen“ eines „Phasenraumes“ entspricht. Der Zustand eines physikalischen Systems wird dann dadurch beschrieben, dass man angibt, wie viele Teilchen sich jeweils in einer Zelle befinden.

Die Annahme, dass jede Lage eines  $n$  Gasmoleküls in  $N$  Zellen gleichwahrscheinlich ist, ist Basis der *Maxwell-Boltzmannsche Statistik*. Dabei wird die Unterscheidbarkeit der Gasmoleküle vorausgesetzt.

Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit  $p(k, n)$ , dass sich genau  $k$  Gasmoleküle in einer beliebigen Zelle  $Z$  der  $N$  Zellen befinden, einer **Binomialverteilung** genügen und zeigen Sie dazu

$$p(k, n) = b(k; n, \frac{1}{N}) := \binom{n}{k} \cdot \left(\frac{1}{N}\right)^k \cdot \left(\frac{N-1}{N}\right)^{n-k} .$$

## Lösung

Jede örtliche Zuordnung der  $n$  Gasmoleküle  $G_1, \dots, G_n$ , so dass sich jedes Molekül in einer der  $N$  Zellen  $Z_1, \dots, Z_N$  befindet, stellt ein Elementarereignis dar.

Wir codieren die Gasmoleküle durch natürliche Zahlen  $1, 2, \dots, n$  und die Zellen durch natürliche Zahlen  $1, 2, \dots, N$ . Die Elementarereignisse  $e \in \Omega$  codieren wir durch  $n$ -Tupel  $e = (e_1, e_2, \dots, e_n)$  mit  $e_i \in [N]$  und der Bedeutung, dass der Wert der  $i$ -ten Komponente von  $e$  die Zelle liefert, in der sich das Molekül  $G_i$  befindet.

Es gilt mit Anwendung des Laplace Prinzips

$$e \in \Omega = \{(e_1, e_2, \dots, e_n); e_i \in [N]\}, \Pr[e] = N^{-n}.$$



## Lösung

Jede örtliche Zuordnung der  $n$  Gasmoleküle  $G_1, \dots, G_n$ , so dass sich jedes Molekül in einer der  $N$  Zellen  $Z_1, \dots, Z_N$  befindet, stellt ein Elementarereignis dar.

Wir codieren die Gasmoleküle durch natürliche Zahlen  $1, 2, \dots, n$  und die Zellen durch natürliche Zahlen  $1, 2, \dots, N$ . Die Elementarereignisse  $e \in \Omega$  codieren wir durch  $n$ -Tupel  $e = (e_1, e_2, \dots, e_n)$  mit  $e_i \in [N]$  und der Bedeutung, dass der Wert der  $i$ -ten Komponente von  $e$  die Zelle liefert, in der sich das Molekül  $G_i$  befindet.

Es gilt mit Anwendung des Laplace Prinzips

$$e \in \Omega = \{(e_1, e_2, \dots, e_n); e_i \in [N]\}, \Pr[e] = N^{-n}.$$

## Lösung

Jede örtliche Zuordnung der  $n$  Gasmoleküle  $G_1, \dots, G_n$ , so dass sich jedes Molekül in einer der  $N$  Zellen  $Z_1, \dots, Z_N$  befindet, stellt ein Elementarereignis dar.

Wir codieren die Gasmoleküle durch natürliche Zahlen  $1, 2, \dots, n$  und die Zellen durch natürliche Zahlen  $1, 2, \dots, N$ . Die Elementarereignisse  $e \in \Omega$  codieren wir durch  $n$ -Tupel  $e = (e_1, e_2, \dots, e_n)$  mit  $e_i \in [N]$  und der Bedeutung, dass der Wert der  $i$ -ten Komponente von  $e$  die Zelle liefert, in der sich das Molekül  $G_i$  befindet.

Es gilt mit Anwendung des Laplace Prinzips

$$e \in \Omega = \{(e_1, e_2, \dots, e_n); e_i \in [N]\}, \Pr[e] = N^{-n}.$$

Wir betrachten nun eine bestimmte Zelle  $Z$ .

Für jedes der  $n$  Moleküle definieren wir eine Bernoulli Variable  $X_i$ , die angibt, ob sich bei Ereignis  $e$  das Molekül  $G_i$  in der Zelle  $Z$  befindet oder nicht. Die Zufallsvariablen  $X_i$  sind Bernoulli-verteilt mit Erfolgswahrscheinlichkeit  $p = \frac{1}{N}$ . Die Zufallsvariablen  $X_1, X_2, \dots, X_n$  sind unabhängig.

Wir betrachten nun eine bestimmte Zelle  $Z$ .

Für jedes der  $n$  Moleküle definieren wir eine Bernoulli Variable  $X_i$ , die angibt, ob sich bei Ereignis  $e$  das Molekül  $G_i$  in der Zelle  $Z$  befindet oder nicht. Die Zufallsvariablen  $X_i$  sind Bernoulli-verteilt mit Erfolgswahrscheinlichkeit  $p = \frac{1}{N}$ .

Die Zufallsvariablen  $X_1, X_2, \dots, X_n$  sind unabhängig.

Nun betrachten wir die Zufallsvariable

$$X_Z = \sum_{i=1}^n X_i.$$

$X_Z$  ist binomialverteilt, i. Z.  $X \sim \text{Bin}(n, \frac{1}{N})$ , mit Dichtefunktion

$$f_{X_Z}(k) = b(k; n, \frac{1}{N}) := \binom{n}{k} \cdot \left(\frac{1}{N}\right)^k \cdot \left(\frac{N-1}{N}\right)^{n-k}.$$

$f_{X_Z}(k)$  ist die gesuchte Wahrscheinlichkeit.